



Экранировка гравитации. Практическая работа


Опыт проводился с диэлектрическими пластинами (плёнкой) толщиной 0.4 мм
Наиболее подходящий материал — пленка для печати струйного принтера.
Плёнку нарезал на прямоугольники 20 на 10 см и заряжал высоким напряжением 12-16 Kv
подавая напряжение на обкладки размером 12 на 5 см. Обкладки располагал в центре плёнки
— диэлектрика.



После поляризации пластин складывал их одна на другую (без обкладок конденсатора).
Чтобы быстро не стекал заряд пластины располагал на двух картонных уголках высотой 8 см.
Пластины укладывал последовательно (минус к плюсу).




Проводя замеры при помощи электроскопа проверял уровень и поляризацию зарядов. Получил примерно такую картинку: (сход не мало полевых транзисторов в электроскопе). Поле просто дикое.




Сильное преобладание отрицательного заряда над верхними пластинами. Индикатор - электроскоп начинает реагировать уже над 20-30 см от поверхности пластин (при наличии уже 4-5 пластин). Положительный заряд менее выраженный обнаруживается снизу и не распространяется за пределы пластин. При увеличении количества пластин до 8 зона распространения зарядов значительно увеличивается, начинают слышаться потрескивания, появляется запах озона. Начинает сбоить электроника.

На только что заряженные пластины (12 шт) в центр кинул деревянную зубочистку — зубочистка около секунды висела в воздухе, потом облетела пластины и залетела под них, упав на стол.


Выглядело так:



При опытах с графитовым стержнем от карандаша (на поверхности пластин) — стержень сносило в сторону от зоны поляризации. Выглядело так:




При подталкивании стерженька деревянной палочкой его упорно сносило на границу зоны поляризации по наименьшему пути. Только ровно в середине была обнаружена ещё одна зона — зона «нулевой точки», куда стержёнок иногда затягивало.




Пластмассовый шарик свободно катающийся в области зоны поляризации с трудом выходил из неё, только небольшой наклон конструкции мог вызвать выход шарика из этой зоны.

Путём долгих опытов с различными предметами выяснил, что поле имеет примерно такую форму:




Направленный поток эфира начинает как бы обтекать зону где происходила поляризация, расходясь в разные стороны и сходясь опять в нижней части под пластинами. При этом на границах места поляризации потоки складываются образуя зону высокой плотности. А в середине происходит всё наоборот — потоки расходятся образуя разрежённость, зону низкой плотности.


Графитовый стержень сносит на границу зоны поляризации именно потоком эфира, который имеет направление от границ зоны поляризации до центра симметрии.



Графитовый стержень сносит до тех пор, пока он не столкнётся с вертикальным потоком, который начинает притягивать его к поверхности.




В зоне нулевой точки (в центре симметрии) действуют разнонаправленные силы с нулевым вектором направленности, что не даёт графитовому стерженьку смещаться.



В зоне низкой плотности наблюдалось значительная потеря веса различных предметов. Например — когда я сложил 5 поляризованных пластин и положил следующую, то верхняя пластина иногда на несколько секунд просто зависала в воздухе. По мере уменьшения заряда на пластине она ложилась на поверхность.

Таблетка активированного угля в зоне низкой плотности передвигается очень легко, словно парила (толкал её деревянной зубочисткой), а в зоне повышенной плотности сильно прилипала к поверхности. **Причём столкнулся с интересным эффектом — в зоне низкой плотности случайно зацепил таблетку что придавало ей вращение, таблетка крутилась во круг своей оси на одном месте секунд 12-15. Было очень похоже на эффект невесомости, хотя она визуальнo лежала на поверхности. Просветил сбоку фонариком и заметил, что таблетка реально крутиться в воздухе (зазор -0.5 мм).** В зоне высокой плотности такого эффекта не было, там таблетку очень сложно сдвинуть с места.




И конечно опыт с зубочисткой которая на секунду зависла в воздухе, тоже в зоне низкой плотности. Такой опыт получается не всегда, а только когда удачно сильно заряжаю (поляризую) пластины. На зарядку каждой пластины нужно время секунд 5-10, когда заряжаю следующую то на предыдущей заряд уже немного теряется и так далее. Когда зарядишь последнюю то первая уже значительно потеряла свой заряд и в сумме это сказывается на общем заряде. Ещё на опыт с зубочисткой влияет место проведения опыта — пространство как бы подстраивается под изменение и если на одном месте первый раз что-то получилось удачное, то на второй раз может не получиться. Но стоит передвинуть немного объект эксперимента на другое место, то в новь можно получить желаемый эффект. (Фантомный эффект). Ещё интересное замечание сила антигравитации начинает возрастать не сразу, а постепенно. **Вспомнил слова Грибенникова — ЭПС возникает не сразу.**

Еще не маловажная информация — каждая пластина заряжается напряжением 12-16 Кв, суммарный заряд на 12 пластинах достигает 140- 190 Кв. Жировые отпечатки пальцев на пластинах токопроводны на таких напряжениях, поэтому возникают искровые пробои, и заряд значительно уменьшается.

Поэтому советую работать в хлопчатобумажных перчатках, а все пластины хорошо протереть чистой и мягкой салфеткой. Советую держать подальше от этой конструкции измерительные приборы и фотокамеры — иногда пробивают молнии.

Выше указанные опыты проводились на диэлектрических пластинах без металлических обкладок, если оставить хотя бы одну обкладку с любой стороны (верх, низ) или сразу две , то эффект пропадает и любые предметы просто притягиваются к поверхности.

Путём замера уровня и полярности заряда при помощи электроскопа и небольшого графитового стерженька, выяснил что поток эфира имеет примерно такой рисунок:



То есть чем ближе к центру симметрии, тем плотнее поток. На границе металлической обкладки начинается зона низкой плотности — небольшое разряжение эфира.

Можно сделать вывод:

При помощи поляризованных доменов диэлектрика происходит частичная экранировка гравитации. Получается антигравитация.

Металлическая пластина нарушает «баланс» и распределяет направление по поверхности металла, чем нарушает эффект антигравитации.

P.S. При помощи магнита и магнитометра Шалатова (поток сносит тень от магнита в сторону направления) я определил направления потока эфира — он направлен от земли (восходящий поток).

Полярность - север внизу !!! (кстати значения магнитометра значительно выше, чем когда просто направляешь на север) — мощный поток.

Дорохов А. П. 2016 г.