


Вихревые преобразователи пространства.

Экспериментируя с асимметричными конденсаторами согласно своей теории нейтральности гравитационных паттернов я добивался эффекта левитации. **Но левитации не было**, самое лучшее что я смог добиться это незначительная потеря веса.

Анализируя свои опыты я пришёл к выводу что процесс выравнивания баланса пространства настолько короткий, что не хватает времени для накопления паттернов отрицательного веса в электроде из активированного угля.



На рисунке 1 показан принцип компенсации паттернов.

Так как площадь электродов сильно отличается а количество паттернов стремиться к одинаковому значению, то происходит «перевес» электрических и гравитационных паттернов на положительной пластине. Это вызывает переворот пространства — а именно «срыв» и пространственное передвижение положительных паттернов в сторону отрицательных как электрических так и гравитационных.

Это особо заметно в конструкции простого ионолета — при работе появляется ионный направленный поток (ветерок).

Если более глубоко посмотреть на свойства асимметричного конденсатора, то мы увидим его главное свойство — **изменять давления эфира к определенным точкам пространства.**

Давайте с этой точки зрения проанализируем работу простого ионолета.

На рисунке 2 изображено «крыло» ионолета «классического» состоящее из тонкой проволоки — анод и катода с большой площадью сделанный из фольги.




Рис.2

При разности давления в эфире (пространстве) возникает компенсационный сдвиг – пространство стремится к нейтральности и начинает заполнять свободное место. Жирные красные стрелки на рисунке 2 – прямой сдвиг пространства (эфира).

Но так как электрические паттерны жестко привязаны к гравитационным, то по инерции массы электрические паттерны начинает «сносить» за пределы зоны низкого давления, что нарушает общий баланс системы. Количество паттернов в зоне высокого давления начинает уменьшаться, процесс не может резко остановиться опять из-за инерции масс гравитационного паттерна. Это вызывает «подсос» паттернов со стороны и образует обратный гравитационный поток (синие жирные стрелки).

Таким образом вокруг электродов начинает образовываться круговой поток пространства (эфира). Это показано на рисунке 3.




Рис. 3

Так как радиусы внутреннего $R1$ и внешнего $R2$ пространства катода (рис. 3) значительно отличаются, а скорость внутреннего и внешнего потока одинаковая, то плотность внутреннего потока будет значительно больше (плотнее). А это значит, что основной поток «захвата» (сцепление с пространством) проходит именно через внутренний поток. Это и вызывает подъемную силу (красная стрелка рис. 3) которая имеет направления противоположное внутреннему потоку.

Благодаря этому ионизет поднимается вверх. Поток ионов который вызывает легкий «ветерок» – это просто вторичный эффект. Это работает, но подъемная сила конечно такого устройства не велика. Это связано с ограничением размеров (площади) катода.

Немного лучшие результаты дают модели где катод изготовлен из пористого электропроводящего материала например активированный уголь. Но все равно подъемная сила такого устройства не значительна и не представляет возможность использовать данный девайс для полетов и передвижения.

Давайте опять вернемся к главному свойству асимметричного конденсатора – изменять давления (плотность) эфира в определенных точках пространства.

Еще напомним про вихревые образования:

Вихревое образование – не стабильное состояния пространства вызванное определенными условиями.

Вспомните какую силу имеет смерч (вихрь) если разобраться, то для получения вихря в атмосфере достаточно создать разность давлений воздуха – т. е. Разность температур в двух точках расположенных ровно одна над другой вертикально..

Похожее оказывается можно сделать и в эфире, при создании разности давлений между верхней и нижней точкой в однородной среде получается стабильное вихревое образование (вихрь) образование вихря обусловлено массой однородной среды и силой гравитационного давления больших тел (земли). Здесь затрачивается только незначительная энергия для создания условий — вихрь образуется сам.

Так почему вихрь не образуется в устройстве ионолета на рис. 2. Оказывается все довольно просто — отсутствует правильность геометрической формы неоднородности пространства.

Если вспомнить про вихрь в атмосфере — температура воздуха от высоты изменяется, это вызывает изменение плотности воздуха нужное для создания правильных форм неоднородности пространства.

Теперь нужно вспомнить о свойстве отражения пространства от материи о которых я много раз упоминал в своих работах.

Немного напомним (вкратце):

диэлектрические материалы своими свойствами имеют частичное отражение электрической составляющей эфира. А так как электрическая составляющая (паттерн) имеет жесткую привязку к гравитационным, то получается что диэлектрический материал имеет свойство отражения пространства.

Это я уже доказывал своими опытами и заострять внимания на этом не буду.

Теперь собираем все сказанное в единое целое и получаем примерно такую конструкцию: (рис. 4)




Рис. 4 примерная конструкция анти — гравитационной ячейки.

из рисунке 4 видно, что форма диэлектрика напоминает форму воронки.

Теперь детально рассмотрим работу данной геометрии. (рис.5)




Рис. 5

Как я уже говорил, скорость потока по внутреннему пространству ячейки и по внешнему абсолютно одинаковая.

Теперь конструкция диэлектрика в нижней части имеет сужение. Это вызывает постепенное увеличение плотности потока, а так как увеличение плотности не может быть бесконечным и имеет свои предельные свойства, то за счет уменьшения радиуса растет скорость потока. Что бы компенсировать равномерность движения общего потока – поток по мере продвижения начинает закручиваться в спираль и получается вихревое образование (вихрь)

Данный вихрь имеет все свойства обычного вихря.

Например за счет масс гравитационных составляющих долгая раскрутка и остановка.

За счет спиралевидной формы пространства внутри ячейки мы имеем форму соприкосновения «зацеп» с пространством в сотни, а то и тысячи раз больше чем в простом ионолете, а как результат во столько же раз вырастает подъемная сила.

Самое главное мы затрачивает не значительную энергию для создания условий – вихрь образуется сам.

Это всего лишь одна ячейка, а если их собрать сотни ???

Вы спросите – а работает ли ваша ячейка? Я отвечу – а работает ли ваш ионолет !!!!