

Торсиометр Дорохова.


Создан прибор который может измерить:

1. биополе.
2. пучности и узлы (уплотнения и разряжения пространства).
3. торсионные поля (различает — правое, левое и прямолинейное)
4. эффективность торсионных генераторов и зона распространение.
5. отклонение поляризации эфира (поиск аномальных зон, подземных вод и тд.)
6. стоячие волны и эффективность эффекта форм.
7. влияние левого торсиона Луны. (при отражении правого солнечного света меняется полярность).
8. торсионную компоненту полупроводниковых лазеров и LED осветителей.
9. правильность расчёта конструкций жилых помещений.
10. поиск неблагоприятных зон в жилых помещениях.

И др...


Торсиометр основан на эффекте влияния эфира (пространства) на плазму. Непосредственно - на холодную плазму в неоновой лампе. Датчиком торсиометра является неоновая лампа МТХ-90, которая работает в режиме авто генерации.

Структурная схема торсиометра:




Торсиометр состоит из аккумуляторного блока (4.2 вольт), Блока преобразователя напряжений (+180 вольт и +5 вольт), автогенератора на неоновой лампе МТХ-90, формирователя прямоугольного импульса, микропроцессорного блока (на Ардуино) и светодиодного индикатора.


Внешний вид силовой платы.



Напряжение с аккумулятора поступает на преобразователь напряжения, который вырабатывает два напряжения +180 - - +300 вольт для питания неоновой лампы и +5 вольт для питания Ардуино и светодиодного индикатора. Неоновая лампа работает по схеме авто генерации со срывом импульса и вырабатывает короткие импульсы длительностью 15 микросекунд.



С частотой следования импульсов 120-140 Гц.





Выходной сигнал после формирователя импульса (для логического уровня) поступает на микропроцессор. Там происходит измерение длительности между короткими импульсами. В данном случае получается значение около 7700 микросекунд. После цифровой обработки (цифровой фильтр и придание значениям стандартный вид) значение выводятся на светодиодном индикаторе.

Мною была придумана единица измерений - «Торсион».

Средний фон эфира при нормальных условиях был принят за значение 2000 торсион.

Большое значение было взято не просто так, учитывалось изменение как с торону уменьшения (узел), так и в сторону увеличения плотности эфира (пучность).

Получилось не плохо. При замерах биополя **простого** человека значение увеличивалось на 100- 150 торсион.



Мне после небольших тренировок удавалось менять значение от 30 до 40 см от датчика, на 100 торсион.


Человек с негативным настроем менял значение уводя их в сторону уменьшения с 2248 до 2130 примерно.

Экран из плотной бумаги не оказывал изменений, а вот заземленные металлические экраны вели себя не предсказуемо.

Например заземленный экран из меди усиливал показания биополя, а экран из алюминия, наоборот уменьшал его. После долгих экспериментов с экранами я понял что частота кристаллической решетки вносит свои коррективы и решил вообще отказаться от экранов. Для экрана можно использовать непрозрачную бумагу, чтобы снизить влияние света на лампу и исключить фотоэффект. **Но лучше использовать вообще без него**, если учитывать что фотоэффект не значителен и составляет всего 0.5-1 % от общего значения.



Самое интересное было что стекло лампы помнит вибрации человека и причём очень долго (примерно 5-12 часов).

Я случайно взял лампу в руки и она мгновенно изменила значение уменьшив его с 2240 до 2170. Моя жена касанием меняла значение до 2060, я опять менял его до 2170.



Значение возвращалось к фоновому только на следующий день или после того, как проходил около лампы огнём от зажигалки. Очень интересно !!!

Была проверенна торсионная компонента полупроводниковых лазеров и света с круговой поляризацией (с левой и с правой).



Результат был легко различим и через плотную чёрную бумагу и без неё. Лазер мощностью 5 милливатт менял значение с 2150 до 1976 примерно. Так же вел себя торсионметр при свете с круговой поляризацией. С левой поляризацией значение уменьшалось до 1950. Экран с плотной чёрной бумаги не влиял на результат.

Это доказывает что свет с левой круговой поляризацией, как и полупроводниковый лазер, имеет торсионную компоненту.

Продолжение следует....

Дорохов А.П. сентябрь 2019 г.